

LES MAMMIFERES

La raréfaction des prédateurs depuis que l'ours, le lynx et le loup ont disparu, a bousculé la pyramide écologique laissant à d'autres espèces, aux petits rongeurs, le loisir de proliférer sans risque. Le renard, lui, se fait rare car chassé par l'homme.

LE CHAMOIS (*Rupicapra Rupicapra*)

On le reconnaît bien-: sa tête est fine et blanche, barrée de chaque côté par une large raie noire, des naseaux à l'oreille; ses cornes (persistantes) s'élèvent verticalement, du sommet de la tête et se terminent en crochets recourbés en hameçon-; son pelage roux en été, devient de plus en plus obscur quand l'hiver approche (cela réchauffe en hiver). Taille 1,20-m. au garrot. Il se nourrit, le matin et le soir, d'herbes, de lichens, de feuilles.

Sa reproduction est la suivante-:

- rut-: entre le 15 novembre et le 15 décembre, période d'observation-;

- gestation: 165-175 jours. Les chevreaux naissent à la mi-juin; les jeunes s'appellent "éterlous".

Le chamois, mieux protégé, est en augmentation dans les Alpes au-delà des réserves. Il y en a environ 5 à 6000 dans les Hautes-Alpes (38000 dans les Alpes)-; la chasse autorisée permet le tir de 600 par an. En trop grand nombre, apparaissent des épidémies (la kérato-conjonctivite).

D'une manière générale, les boucs vivent solitaires ou par deux ou trois, sauf en période de rut. Les femelles, elles, se regroupent en "chevrées" composées de chèvres, de chevreaux et d'éterlous. Dans les régions où l'homme ne chasse pas, les chamois se laissent approcher. Mais ils craignent leurs prédateurs dont l'aigle, le renard, mais aussi les chiens errants.

LE RENARD (*Vulpes Vulpes*)

Renard d'Europe-: corps 50 à 60-cm. queue environ 15-cm. Très utile destructeur de mulots et de petits rongeurs et accessoirement du reste-: œufs, jeunes oiseaux, déchets ménagers et parfois basse-cour. Il a été pourchassé en toutes saisons. Vecteur de la rage, ce caractère ne l'aide pas aujourd'hui. Il survit cependant dans la région-; il s'approche parfois des habitations. On l'entend glapir, aboyer et grogner (lorsqu'il est mécontent).

Les marmottes peuvent s'approprier si on les laisse en semi-liberté-; d'herbivores elles deviennent omnivores.



Médaille romaine où figure un bouquetin

Les souvenirs romains attestent la grande diversité des espèces animales dans les Alpes d'autrefois.

L'ours, il y a des siècles, le lynx et le loup au XX^{ème} siècle ont disparu. Et sans les parcs nationaux et régionaux, chamois, bouquetins et mouflons ne seraient sans doute plus là.

Le parc de la Vanoise a bien aidé le bouquetin-; le mouflon a été réintroduit, ici et là, en Ubaye par exemple en 1960, mais il n'aime pas le froid. Le chamois, lui, se plaît en Queyras. Continuons à le protéger.

LA MARMOTTE (*Marmota, Marmotta ou Mus Montanus*)

Ce rongeur de 50 à 60-cm peut se voir, parfois à quelques dizaines de mètres, dressé sur son arrière train et sifflant à l'approche d'un danger. L'aigle en fait son repas favori. Son pelage est brun jaunâtre, son corps puissant de 4 à 8-kg, ses pattes courtes, sa queue touffue, sa tête ressemblant à celle d'un lapin, ses pattes de devant ont 4 doigts-; elles servent à creuser les terriers-; ses pattes de derrière ont 5 doigts et servent de pelle pour évacuer la terre. La marmotte se nourrit de graminées, légumineuses, fruits, baies, écorces. (elle a 22 dents).

---Accouplement-: mi-avril, mi-mai gestation-: 5 semaines-; une reproduction tous les 2 ans. Les marmottes vivent en groupe. L'hiver elles dorment sous terre et perdent 2-kg.

Certains secteurs seraient surpeuplés ce qui fait dire qu'elles abiment les pâturages par leurs nombreux terriers. Mais la régulation se fait d'elle-même par les maladies ou les parasites.

LE LIEVRE VARIABLE (*Lepus timidus*)

Blanc l'hiver, couleur terre grise l'été, est difficile à voir à cause de ce mimétisme qui le protège-; taille environ 60-cm. (queue 6-cm.). Ses oreilles ont des pointes noires. Se déplace au crépuscule et la nuit mais est parfois actif le jour-; s'abrite comme il peut (cailloux, rochers)-; peut vivre sous la neige l'hiver-; se nourrit de graminées, d'herbes, d'écorces, de bourgeons, souffle lorsqu'il est mécontent et crie en cas de danger.

L'HERMINE (*Mustela ermina*)

Taille 20 à 30-cm. (queue 8-cm., blanche en hiver), pelage beige-; l'été, vit dans la journée et l'hiver-, la nuit. Très vif et agile, cet animal se nourrit de petits rongeurs et de petits oiseaux-; en cas de danger-: cris perçants et forte odeur.

LE MOUTON

Il y en a l'été... 37000 environ en transhumance, généralement par troupeaux de 1000 à 2500 bêtes. Des bergers les gardent dans la montagne du 15 juin au 30 septembre. Ces bêtes viennent, pour la plupart, de la Provence ou du bas du département. Deux races sont présentes-

- une race préalpe.
- une race métisse issue d'un croisement avec du mérinos (reconnaisable par une toison très fournie jusqu'au dessus de la tête).

Il y a très peu de brebis laitières-: les agneaux sont élevés pour leur viande.

On évitera de s'approcher des troupeaux qui ont besoin, eux aussi, de tranquillité.



La foire aux moutons, le 28 septembre à Ceillac, est un moment fort de l'élevage queyrassin.

	Longévité (années)	Poids mâles (kilos)	Saison accouplement	Durée gestation	Petits par portée
Chamois	12 - 18	35 - 50	nov. à décembre	26 s.	1 à 2
Lièvre variable	10 - 12	3 - 5	mars à juillet	50 j.	2 à 5
Marmotte	15 - 18	4 - 8	avril et mai	34 j.	2 à 4
Renard	10 - 12	6 - 9	janvier à mars	51 j.	3 à 8
Hermine	8 - 10	0,13 - 0,3	février à août	8 s.	4 à 9